

¿Qué es el BCG?

El bacillus de Calmette y Guérin, más conocido por su sigla BCG, es una forma atenuada de la bacteria *mycobacterium bovis* que no causa enfermedad. Se administra en solución directamente en la vejiga a través de una sonda urinaria. Es un tratamiento localizado que no afecta al estado general. A continuación, le ofrecemos una serie de recomendaciones:

Antes del tratamiento

- Beba poco líquido durante el día.
- No es necesario estar en ayunas.
- Puede venir acompañado.

Tratamiento

- No es doloroso.
- El tiempo de preparación y administración es aproximadamente de 15 minutos.
- Es aconsejable que miccione antes de su administración.

Después del tratamiento

- Tiene que estar una hora y media en reposo, estirado y sin miccionar.
- Realice cambios posturales cada 15 minutos para que se reparta el medicamento: decúbito lateral derecho e izquierdo y decúbito supino y prono.
- Pasada la hora y media debe beber abundante líquido para eliminar el medicamento y así disminuir las posibles molestias.
- Se recomienda usar preservativo en las relaciones sexuales durante las primeras 48 horas después de su instalación.
- Tire lejía después de miccionar en el lavabo durante las 48 horas siguientes.
- No debe miccionar en lugares públicos como la piscina o la playa.
- Miccionar sentado las primeras 48 horas (para no salpicar).

¿Qué le puede pasar?

Durante las 24-48 horas posteriores al tratamiento es normal que aparezca:

- Febrícula (décimas de fiebre).
- Polaquiuria (tener muchas ganas de orinar y a menudo, pero miccionar poca cantidad).
- Hematuria (restos de sangre en la orina incluidos coágulos).
- Escozor al miccionar.

Si presenta fiebre (38° o más) y las molestias (polaquiuria, hematuria, escozor) duran más de 48-72 horas, avise al Hospital de Día Médico o acuda al Servicio de Urgencias.

Horario de atención del Hospital de Día Médico

De lunes a jueves, de 8 h a 17 h y viernes de 8 h a 14 h.

