

Què és el BCG?

El bacil de Calmette i Guérin, més conegut per la seva sigla BCG, és una forma atenuada del bacteri *mycobacterium bovis* que no causa malaltia. S'administra en solució directament a la bufeta a través d'una sonda urinària. És un tractament localitzat que no afecta a l'estat general. A continuació, us oferim una sèrie de recomanacions:

Abans del tractament

- Beveu poc líquid durant el dia.
- No cal estar en dejú.
- Podeu venir acompanyats.

Tractament

- No és dolorós.
- El temps de preparació i administració és de 15 minuts aproximadament.
- S'aconsella orinar abans de l'administració.

Després del tractament

- Heu d'estar una hora i mitja en repòs, estirats i sense orinar.
- Realitzeu canvis de postura cada 15 minuts per tal que es distribueixi el medicament: decúbit lateral dret i esquerre i decúbit supí *pron*.
- Després de l'hora i mitja heu de beure abundant líquid per eliminar el medicament i així disminuir les possibles molèsties.
- És recomanable utilitzar preservatiu en les relacions sexuals durant les primeres 48 hores després de la instal·lació.
- Llanceu lleixiu després d'orinar al lavabo durant les 48 hores següents.
- No orineu en en llocs públics com la piscina o la platja.
- Orineu asseguts les primeres 48 hores (per no esquitxar).

Què us pot passar?

Durant les 24-48 hores posteriors al tractament és normal que aparegui:

- Febrícula (dècimes de febre).
- Pol·laquiúria (tenir moltes ganes d'orinar i sovint, però orinar poca quantitat).
- Hematúria (restes de sang a l'orina inclosos coàguls).
- Coïssor a l'orinar.

Si teniu febre (38° o més) i les molèsties (pol·laquiúria, hematúria, picor) duren més de 48-72 hores, aviseu a l'Hospital de Dia Mèdic o aneu al Servei d'Urgències.

Horari d'atenció de l'Hospital de Dia Mèdic

De dilluns a dijous, de 8 h a 17 h i divendres de 8 h a 14 h.

