



Instruccions Què és la Mitomicina?

És un fàrmac amb acció citotòxica que s'administra mitjançant una sonda urinària a la bufeta de l'orina. El medicament actua localment sobre la mucosa vesical i serveix per prevenir la reparació de lesions superficials a la paret de la bufeta després d'una resecció transuretral. És un tractament local, amb mínima absorció sistèmica i no afecta a la salut general. En casos poc freqüents pot produir: cistitis química severa, estenosi uretral o reaccions al·lèrgiques.

Abans del tractament

- Beveu poc líquid durant les hores prèvies al tractament (no cal estar amb dejú).
- Podeu venir acompanyat.

Tractament

- No és dolorós.
- El temps d'administració i preparació és de 15 minuts aproximadament.
- Haurà d'orinar just abans de l'administració.

Després del tractament

- Heu d'estar una hora i mitja en repòs, estirats i sense orinar. No podeu beure líquids.
- Realitzeu canvis de postura cada 15 minuts per tal que es distribueixi el medicament: lateral dret, lateral esquerre, decúbit supí (panxa amunt) i decúbit pron (panxa avall).
- Després de l'hora i mitja des que heu sortit de l'hospital heu de beure abundant líquid per facilitar l'eliminació del medicament.
- Orinar asseguts les primeres 48 hores per evitar esquitxades.
- Llanceu lleixiu al wc cada cop que orineu i tireu 2 cops de la cisterna.
- Eviteu orinar en llocs públics les primeres hores, incloent-hi platja i piscina.
- Es recomana usar preservatiu si teniu relacions sexuals les primeres 48 hores.

Què pot passar?

Durant les primeres 24-48 h posteriors al tractament és normal i freqüent que aparegui:

- Coïssor a l'orinar.
- Febrícula o sensació de malestar.
- Polaquiúria (orinar poca quantitat i sovint).
- Hematúria (restes de sang a l'orinar i/o glevos).

Recordeu que heu de consultar si teniu febre aprox. de 38°C amb esgarrafances o les molèsties s'allarguen més de 72 hores. Els horaris d'atenció de l'Hospital de Dia Mèdic són de dilluns a dijous de 8 a 17 hores i divendres de 8 a 14 hores.

