




**Badalona
Serveis
Assistencials**

**PROCEDIMENT PER EL MANEIG I US DE MEDICAMENTS
MULTIDOSI A BSA**

Edició: 1

Data: 01-09-2025

Pàgina 1 de 13

ELABORA:	REVISA:	APROVA:
Sra. Verónica Delgado Infermera Unitat de Qualitat i Seguretat del pacient.  Data: 01-09-2025	Sra. Begoña Pascual Cap del Servei de Farmàcia  Data: 01-09-2025	Sra. Cristina Carod Directora Assistencial  Data: 01-09-2025

**PROCEDIMENT PER EL MANEIG I
US DE MEDICAMENTS MULTIDOSI
A BSA**

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT PER EL MANEIG I US DE MEDICAMENTS MULTIDOSI A BSA	
Edició: 1	Data: 01-09-2025	Pàgina 2 de 14

Data de caducitat d'aquest procediment: 2 anys

Edició	Data	Modificacions introduïdes respecte edicions anteriors
1	01-09-2025	Actualització annexes amb nous fàrmacs i canvis en la validesa i conservació. S'inclou full resum dels fàrmacs multidosi per àmbits.

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT PER EL MANEIG I US DE MEDICAMENTS MULTIDOSI A BSA	
Edició: 1	Data: 01-09-2025	Pàgina 3 de 14

ÍNDEX

1. OBJECTE.....	4
2. ABAST.....	4
3. REFERÈNCIES.....	4
4. DEFINICIONS.....	4
5. DESENVOLUPAMENT.....	5
5.1.- Normes generals per a la manipulació medicaments administrats per VIA ORAL:.....	5
5.2.- Normes generals per a la manipulació de medicaments administrats per VIA PARENTERAL:.....	5
5.4- Normes generals per a la manipulació medicaments administrats per VIA INHALATÒRIA:.....	6
5.5- Normes generals per a la manipulació medicaments administrats per VIA TÒPICA:....	6
6. RESPONSABILITATS.....	7
7. ANNEXES.....	7
ANNEX 1 (Cartell resum fàrmacs multidosi TRANSVERSAL).....	7
ANNEX 2 (Cartell resum fàrmacs multidosi SALUT MENTAL).....	10
ANNEX 3 (Cartell resum fàrmacs multidosi ATENCIÓ PRIMÀRIA).....	11
ANNEX 4 (Cartell resum fàrmacs multidosi HMB i AI).....	12

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT PER EL MANEIG I ÚS DE MEDICAMENTS MULTIDOSI A BSA	
Edició: 1	Data: 01-09-2025	Pàgina 4 de 14

1. OBJECTE

La utilització de medicaments en envasos multidosi és habitual en tots els nivells assistencials. La utilització inadequada pot resultar ser perjudicial per al pacient i afectant la seva seguretat.

Es pretén establir unes directrius per a la correcta utilització dels fàrmacs en envasos multidosi seguint criteris de seguretat i eficiència, garantint l'estabilitat farmacèutica, el seu etiquetat i la disminució dels riscos d'infecció. Cal conèixer el període d'estabilitat dels fàrmacs multidosi que es manipulen i aplicar els procediments establerts a continuació.

2. ABAST

Aquest procediment aplica a tot el personal sanitari que estigui involucrat en el procés d'ús i maneig dels medicaments multidosi i afecta directament a tots els nivells assistencials de Badalona Serveis Assistencials.

3. REFERÈNCIES

1. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Centro de información online de medicamentos de la AEMPS. Consultado 08/11/2024. Disponible en: <https://www.aemps.gob.es/>
2. Vademecum. Consultado 08/11/2024. Disponible en: <https://www.vademecum.es/>
3. Gaspar Carreño, M., Gaviño Prado, C., Torrico Martín, F., Márquez Peiró, J. F., Navarro Ferrer, F., & Tudela Orteils, V. (2013). Recomendaciones de conservación y período de validez de los envases multidosi tras su apertura. *Farmacia Hospitalaria*, 2013; 37(6):450-468.
4. [Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio](#), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. (BOE nº. 177, de 25 de julio de 2015).
5. Procediment per a la gestió de magatzems i ús segur del medicament a l'Atenció Primària. Badalona Serveis Assistencials.

4. DEFINICIONS

Envàs multidosi: Recipient que conté la quantitat suficient de producte per a dues o més dosis.

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT PER EL MANEIG I US DE MEDICAMENTS MULTIDOSI A BSA	
Edició: 1	Data: 01-09-2025	Pàgina 5 de 14

Estabilitat: La capacitat d'un producte farmacèutic per a conservar les seves propietats químiques, físiques, microbiològiques i biofarmacèutiques dintre dels límits especificats, al llarg del seu temps de conservació.

Condicions d'emmagatzematge: Es refereix a les condicions de les àrees de conservació dels medicaments que estan definits en els estudis d'estabilitat dels fàrmacs.

Temperatura ambient: Entre 15-30°C en lloc fresc, sec i ventilat.

Temperatura de refrigeració: Entre 2-8°C

Temperatura de congelació: Entre -25 i -10°C

Medicament: Formulació que conté un o més principis actius així com ingredients inactius. Els medicaments es fabriquen en diferents presentacions (comprimits, càpsules, líquids, cremes, pegats...). La formulació que conté el fàrmac (principi actiu) es fa servir per prevenir, diagnosticar, tractar o alleujar els símptomes d'una malaltia o afecció. Un medicament que no conté un principi actiu i que es fa servir en els estudis de recerca (placebo), també es considera un producte farmacèutic.

5. DESENVOLUPAMENT

A continuació, es detallen els punts a tenir en compte a l'hora d'administrar i emmagatzemar un fàrmac multidosi. La informació sobre la conservació i el període de validesa dels fàrmacs multidosi es pot consultar a l'annex 1 d'aquest document.

5.1.- Normes generals per a la manipulació medicaments administrats per VIA ORAL:

- Es podran utilitzar per a diversos pacients, administrant a cadascun la seva dosi corresponent.
- Sempre que sigui possible, es facilitaran dosis unitàries.
- En el cas de preparacions específiques de medicació per a pacients, es seguiran les normes de conservació indicades per el Servei de Farmàcia.
- Si el pacient rep l'alta hospitalària abans que caduqui el medicament, aquest es llençarà d'acord amb les recomanacions del pla de gestió intracentres de residus sanitaris o, si s'escau, s'entregarà al pacient en el moment de l'alta.
- **Cal registrar sempre a l'envàs, una cop obert, la data de caducitat segons el període establert a l'annex 1.**

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT PER EL MANEIG I ÚS DE MEDICAMENTS MULTIDOSI A BSA	
Edició: 1	Data: 01-09-2025	Pàgina 6 de 14

5.2.- Normes generals per a la manipulació de medicaments administrats per VIA PARENTERAL:

- Sempre que sigui possible, es facilitaran preparats parenterals en **dosis unitàries** per a ús exclusiu del pacient, seguint el procediment establert a la nostra organització: *“Procediment de prescripció i administració segura de medicació”*.
- Les plomes multidosi (insulina) **seran d'ús exclusiu per pacient** identificant-les amb la etiqueta identificativa del pacient (**nom, cognoms i CIP o DNI**). S'indicarà la data de caducitat segons període establert a l'annex 1. A l'alta del pacient, se li entregarà la ploma o, si no procedeix, es rebutjarà.

5.3.- Normes generals per a la manipulació medicaments administrats per VIA OFTÀLMICA, ÒTICA I NASAL:

- Utilitzar un envàs per pacient.
- En cas d'envasos monodosi, un cop oberts són d'un sol ús i s'han rebutjar.
- **Identificant-los amb** la etiqueta identificativa del pacient (**el nom, cognoms i CIP o DNI**). Indicar la **data de caducitat** segons el període establert a l'annex 1. A l'alta del pacient, se li entregarà l'envàs o, si no procedeix, es rebutjarà.
- Assegurar l'asèpsia en la manipulació per evitar infeccions creuades.
- Tancar bé l'envàs després de cada ús.

5.4- Normes generals per a la manipulació medicaments administrats per VIA INHALATÒRIA:

- Envasos a pressió:
 - Cal utilitzar un dispositiu per a cada pacient, **Identificant-lo amb** la etiqueta identificativa del pacient (**nom, cognoms i CIP o DNI**).
 - Indicar la data de caducitat segons el període establert a l'annex 1.
 - Si fos necessari, el dispositiu podrà ser entregat en el moment de l'alta.
- Les solucions per nebulització en monodosi:
 - Aquestes solucions seran d'ús unipersonal i no es podran reutilitzar entre pacients.

5.5- Normes generals per a la manipulació medicaments administrats per VIA TÒPICA:

- S'anotarà a l'envàs la data de caducitat segons annex 1.
- En la mesura del possible, afavorir l'ús individualitzat, **identificant-los amb** la etiqueta identificativa del pacient (**nom, cognoms i CIP o DNI**).

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT PER EL MANEIG I US DE MEDICAMENTS MULTIDOSI A BSA	
Edició: 1	Data: 01-09-2025	Pàgina 7 de 14

- Assegurar l'asèpsia en la manipulació per evitar infeccions creuades.

IMPORTANT

- *No s'obrirà cap envàs multidosi sense comprovar abans que no n'existeixi un altre igual en ús.*
- **No es podrà deixar cap agulla inserida en el vial** per a la dosificació de cap medicament.
- *Un cop obert l'envàs, s'hauran de seguir les indicacions específiques de caducitat indicades en aquest document.*
- **Les caducitats especificades a l'annex són dates màximes; sempre prevaldrà la data de caducitat de l'envàs.**
- *En cas que el fàrmac multidosi no estigui inclòs a l'annex d'aquest document, es consultarà amb el Servei de Farmàcia les recomanacions de conservació.*

6. RESPONSABILITATS

Servei de Farmàcia:

- Actualitzar i revisar els llistats de validesa dels fàrmacs disponibles en envasos multidosi.
- Resoldre dubtes sobre la validesa d'un fàrmac.

Personal sanitari involucrat procés d'ús i maneig dels medicaments multidosi:

- Complir amb l'establert al procediment.
- Haurà d'etiquetar o senyalitzar la medicació multidosi, **amb la data de caducitat establerta segons aquest protocol** i assegurar-se de la seva correcta conservació i emmagatzematge. En el cas d'una medicació d'ús individualitzat, caldrà identificar-la correctament (nom, cognoms i CIP o DNI).
- Revisar setmanalment els medicaments multidosi disponibles i dates de caducitat.
- Consultar o comunicar al farmacèutic qualsevol dubte o incidència sobre la utilització de fàrmacs multidosi.

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT PER EL MANEIG I US DE MEDICAMENTS MULTIDOSI A BSA	
Edició: 1	Data: 01-09-2025	Pàgina 8 de 14

7. ANNEXES

ANNEX 1 (Cartell resum fàrmacs multidosi TRANSVERSAL (AP, S.Mental, CSSC i HMB))

CONSERVACIÓ I PERÍODE DE VALIDESA DELS FÀRMACS MULTIDOSI CARTELL TRANSVERSAL : <i>Atenció Primària, Salut Mental, CSSC i HMB</i>			
NOM COMERCIAL	PRINCIPI ACTIU	VALIDESA ENVÀS OBERT	CONSERVACIÓ ENVÀS OBERT
Via oral: xarops, solucions i suspensions			
BUCALSONE ®	Fluorur sòdic i xilitol	2 mesos	Temperatura ambient (15 °C a 25 °C)
DALSY® 20mg/ml	Ibuprofè	12 mesos	
DEXTROMETORFANO 15 mg/ 5 ml	Hidrobromur Dextrometorfan	Caducitat de l'envàs*	
DIFLUCAN Pols suspensió oral ® 10 mg/ml	Fluconazol	Suspensió reconstituïda 28 dies	
DUPHALAC® 667 mg/ml	Lactulosa	Caducitat de l'envàs*	
ESTILSONA® 13.3mg/ml gotes	Prednisolona esteaglat	Caducitat de l'envàs*	
HALOPERIDOL® 2mg/ml gotes haloperidol	Haloperidol	Caducitat de l'envàs*	
MAGNESIA LAINCO® 200mg/ml	Hidròxid de Magnesi	Caducitat de l'envàs*	
MOTILIUM® 1mg/ml	Domperidona	Caducitat de l'envàs*	
MYCOSTATIN® 100.000 UI/ml	Nistatina	7 dies	
PARACETAMOL 100mg/ml KERN ®	Paracetamol	6 mesos	
PRIMPERAN® 1mg/ml	Metoclopramida	Caducitat de l'envàs*	
PUNTUALSENA ® 30 mg/ml	Senòsids A i B	Caducitat de l'envàs*	
RISPERIDONA CINFA EFG 1mg/ml	Risperidona	3 mesos	

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT PER EL MANEIG I US DE MEDICAMENTS MULTIDOSI A BSA	
Edició: 1	Data: 01-09-2025	Pàgina 9 de 14

RIVOTRIL® 2,5 mg/ml gotes	Clonazepam	4 mesos	
TRAMADOL ASTA MEDICA EFG 100mg/ml	Tramadol	12 mesos	
TRINISPRAY ® 0.4MG/0.05 ml	Nitroglicerina	Caducitat de l'envàs*	
Via oral: espesants			
ESPESANTS ALIMENTARIS	No procedeix	Un cop preparat 6 hores	Temperatura ambient (15 °C a 25 °C)
		Un cop preparat 24 hores	Refrigerat entre 2°C i 8°C
		Pot obert 2 mesos	Temperatura ambient (15 °C a 25 °C)
Via tòpica: cremes, locions, pomades, esprais i solucions			
AMNIOLINA® 50g	Òxid de zinc, talc	Caducitat de l'envàs*	Temperatura ambient (15 °C a 25 °C)
BLASTOESTIMULINA® 10 mg/g	Extracto Centella asiàtica	3 mesos	
CALAMINA LOCIÓ	Calamina	2 setmanes	Protegit de la llum / Tª < 30°C
DAKTARIN CREMA®	Miconazol	Caducitat de l'envàs*	Temperatura ambient (15 °C a 25 °C)
DIPROGENTA® 0.5 mg/g + 1mg/g	Betamesona Gentamicina	3 mesos	
ESENTA ® ADHE. REMOVER / SKIN BARRIER	Siliconas	Data caducitat de l'envàs*	
FURACIN® 2mg/g	Nitrofurul	Caducitat de l'envàs*	Protegit de la llum / Tª < 30°C
INTRASITE GEL ® (HIDROGELS)	Carboximetilcelulosa sódica	1 setmana (Ús individual)	Temperatura ambient (15 °C a 25 °C)
IODOSORB® 4g	Codexomer lodat	3 mesos (Ús individual)	
IRUXOL MONO®	Clostridopeptidasa	6 mesos	
LUBRICANTE TETRACAINA LAINCO® 7,5 mg/g	Hidrocloruro Tetracaïna	Caducitat de l'envàs*	
LINIMENTO OLEOCALCAREO + OZN 10%	Òxid de zinc	Caducitat de l'envàs*	
Data actualització: 01-09-2025			

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT PER EL MANEIG I US DE MEDICAMENTS MULTIDOSI A BSA	
Edició: 1	Data: 01-09-2025	Pàgina 10 de 14

Via inhalatòria i nasal: aerosols			
TOTS INHALADORS D'ENVÀS A PRESSIÓ	No procedeix	Data caducitat de l'envàs/ Ús individual	Temperatura ambient (15 °C a 25 °C)
BUDESONIDA ®	Budesonida	Obert el sobre que conté monodosis 3 mesos.	Protegit de la llum / Tª < 25°C
IPRATROPIO BROMURO®	Ipratropio Bromuro	Oberta monodosis us im- mediat.	
Perfusions-dilucions			
TOTES (Consultar Document perfusions)	No procedeix	24 hores	Temperatura inferior a 25 °C Segons fàrmac, protegir de la llum
Tires reactives			
COAGUCHECK ®	Determinació coagulació	Data caducitat de l'envàs*	A Tª ambient o al refrigerador 2-30 °C
CONTOUR ®	Determinació glucosa	Data caducitat de l'envàs*	Conservació a Tª 5-30 °C
DIRUI ®	Anàlisi d'orina àcid aceto- acètic	Data caducitat de l'envàs*	Conservació a Tª 15-30 °C
TIRA ORINA 11 PARAMETROS ACRO BIOTECH ®	Anàlisi d'orina	6 mesos	A Tª ambient o al refrigerador 2-30 °C
PPD			
Tuberculina PPD	Tuberculina	24 hores	Refrigerat entre 2 °C i 8°C i protegit de la llum
Insulines			
TOTES LES INSULINES	PLOMA	4 setmanes (28 dies)	Abans d'obrir: 2-8°C. Després d'obrir: < 25°C
Data actualització: 01-09-2025		<i>*Sempre que les condicions siguin les idònies.</i> (Pàgina 2 de 2)	

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT PER EL MANEIG I US DE MEDICAMENTS MULTIDOSI		
Edició: 1	Data: 01-08-2025	Pàgina 11 de 14	

ANNEX 2 (Cartell resum fàrmacs multidosi SALUT MENTAL)

TAULA RESUM: CONSERVACIÓ I PERÍODE DE VALIDESA DELS FÀRMACS MULTIDOSI: SALUT MENTAL			
NOM COMERCIAL	PRINCIPI ACTIU	VALIDESA ENVÀS OBERT	OBSERVACIÓ
Via tòpica: antisèptics i desinfectants			
ALCOHOL 70º	Alcohol 70º	Data caducitat de l'envàs*	Temperatura ambient (15 ºC a 25 ºC)
CLORHEXIDINA SOL. AQUOSA	Clorhexidina	3 mesos	
CLORHEXIDINA SOL. ALCOH.	Clorhexidina	6 mesos	
POVIDONA IODADA	Povidona Iodada	Data caducitat de l'envàs*	
STERILLIUM GEL 100ML	Alcohol 70º	Data caducitat de l'envàs*	
Tires reactives			
CONTOUR ®	Determinació glucosa	Data caducitat de l'envàs*	Conservació a Tª 5 - 30 ºC
Data actualització: 01-09-2025		*Sempre que les condicions siguin les idònies.	
(Pàgina 1 de 1)			

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT PER EL MANEIG I US DE MEDICAMENTS MULTIDOSI	
Edició: 1	Data: 01-08-2025	Pàgina 12 de 14

ANNEX 3 (Cartell resum fàrmacs multidosi ATENCIÓ PRIMÀRIA)

TAULA RESUM: CONSERVACIÓ I PERÍODE DE VALIDESA DELS FÀRMACS MULTIDOSI: ATENCIÓ PRIMÀRIA			
NOM COMERCIAL	PRINCIPI ACTIU	VALIDESA ENVÀS OBERT	CONSERVACIÓ ENVÀS OBERT
Via oral: xarops, solucions i suspensions			
DALSY® 20mg/ml	Ibuprofè	12 mesos	Temperatura ambient (15 °C a 25 °C)
ESTILSONA® 13.3 mg/ml gotes	Prednisolona esteaglat	Caducitat de l'envàs*	
PARACETAMOL 100mg/ml KERN ®	Paracetamol	6 mesos	
TRINISPRAY ® 0.4MG/0.05 ml	Nitroglicerina	Caducitat de l'envàs*	
Via tòpica: cremes, locions, pomades, esprais i solucions tòpiques			
BLASTOESTIMULINA® 10 mg/g	Extracto Centella asiàtica	3 mesos	Protegit de la llum / Tª < 30°C
DIPROGENTA® 0.5 mg/g + 1mg/g	Betamesona Gentamicina	3 mesos	
FURACIN® 2mg/g	Nitrofurul	Caducitat de l'envàs*	
INTRASITE GEL ® (HIDROGELS)	Carboximetilcelulosa sódica	1 setmana (Ús individual)	Temperatura ambient (15 °C a 25 °C)
IODOSORB® 4g	Codexomer Iodat	3 mesos ((Us individual)	
IRUXOL MONO®	Clostridopeptidasa	6 mesos	
LUBRICANTE TETRACAINA LAINCO® 7,5 mg/g	Hidrocloruro Tetracaïna	Caducitat de l'envàs*	
LINIMENTO OLEOCALCAREO + OZN 10%	Òxid de zinc	Caducitat de l'envàs*	
MEPENTOL ® / MEPENTOL LECHE	Àcids Grasos Hiperoxigenats	12 mesos	
MICRODACYN ®	Àcid Hipoclorós, hipoclorit Sòdic	1 mes	
MUPIROCINA GALENICUM DERMA® 20mg/g	Mupirocina	10 dies	
SILVEDERMA 10mg/g®	Sulfazidina de plata	Caducitat de l'envàs*	
Via tòpica: antisèptics i desinfectants			
ALCOHOL 70º	Alcohol 70º	Data caducitat de l'envàs*	Temperatura ambient (15 °C a 25 °C)
CLORHEXIDINA SOL. AQUOSA	Clorhexidina	3 mesos	
CLORHEXIDINA SOL. ALCOH.	Clorhexidina	6 mesos	
NOBECUTAN ®	Acetat d'Etil + Propelent	Data caducitat de l'envàs*	
POVIDONA IODADA	Povidona Iodada	Data caducitat de l'envàs*	
STERILLIUM GEL 100ML	Alcohol 70º	Data caducitat de l'envàs*	
Tires reactives			
COAGUCHECK ®	Determinació coagulació	Data caducitat de l'envàs*	A Tª ambient o al refrigerador 2-30 °C
CONTOUR ®	Determinació glucosa	Data caducitat de l'envàs*	Conservació a Tª 5-30 °C
DIRUI®	Anàlisi d'orina àcid acetoacètic	Data caducitat de l'envàs*	Conservació a Tª 15-30 °C
PPD			
TUBERCULINA PPD	Tuberculina	24 hores	Refrigerat entre 2 °C i 8°C i protegit de la llum
Data actualització: 01-09-2025		*Sempre que les condicions siguin les idònies.	

Pàgina 1 de 1

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT PER EL MANEIG I US DE MEDICAMENTS MULTIDOSI	
Edició: 1	Data: 01-08-2025	Pàgina 13 de 14

ANNEX 4 (Cartell resum fàrmacs multidosi HOSPITAL MUNICIPAL BADALONA i ATENCIÓ INTERMÈDIA)

CONSERVACIÓ I PERÍODE DE VALIDESA DELS FÀRMACS MULTIDOSI: HMB I ATENCIÓ INTERMÈDIA			
NOM COMERCIAL	PRINCIPI ACTIU	VALIDESA ENVÀS OBERT	CONSERVACIÓ ENVÀS OBERT
Via oral: xarops, solucions i suspensions			
BUCALSONE ®	Fluorur sòdic i xilitol	2 mesos	Temperatura ambient (15 °C a 25 °C)
DEXTROMETORFANO 15 mg/ 5 ml	Hidrobromur Dextrometorfan	Caducitat de l'envàs*	
DIFLUCAN Pols suspensió oral ® 10 mg/ml	Fluconazol	Suspensió reconstituïda 28 dies	
DUPHALAC® 667 mg/ml	Lactulosa	Caducitat de l'envàs*	
HALOPERIDOL® 2mg/ml gotes	Haloperidol	Caducitat de l'envàs*	
MAGNESIA LAINCO® 200mg/ml	Hidroxid de Magnesi	Caducitat de l'envàs*	
MOTILIUM® 1mg/ml	Domperidona	Caducitat de l'envàs*	
MYCOSTATIN® 100.000 UI/ml	Nistatina	7 dies	
PARACETAMOL 100mg/ml KERN ®	Paracetamol	6 mesos	
PRIMPERAN® 1mg/ml	Metoclopramida	Caducitat de l'envàs*	
RISPERIDONA CINFA EFG 1mg/ml	Risperidona	3 mesos	
RIVOTRIL® 2,5 mg/ml gotes	Clonazepam	4 mesos	
TRAMADOL ASTA MEDICA EFG 100mg/ml	Tramadol	12 mesos	
TRINISPRAY ® 0.4MG/0.05 ml	Nitroglicerina	Caducitat de l'envàs*	
Via oral: espesants			
ESPESANTS ALIMENTARIS	No procedeix	Un cop preparat 6 hores	Temperatura ambient (15 °C a 25 °C)
		Un cop preparat 24 hores	Refrigerat entre 2°C i 8°C
		Pot obert 2 mesos	Temperatura ambient (15 °C a 25 °C)
Via tòpica: cremes, locions, pomades, esprais i solucions tòpiques			
AMNIOLINA® 50g	Òxid de zinc, talc	Caducitat de l'envàs*	Temperatura ambient (15 °C a 25 °C) Protegit de la llum / Tª < 30°C
BLASTOESTIMULINA® 10 mg/g	Extracto Centella asiàtica	3 mesos	
CALAMINA LOCIÓ	Calamina	2 setmanes	
DAKTARIN CREMA®	Miconazol	Caducitat de l'envàs*	Temperatura ambient (15 °C a 25 °C)
DIPROGENTA® 0.5 mg/g + 1mg/g	Betamesona Gentamicina	3 mesos	
ESENTA ® ADHE. REMOVER / SKIN BARRIER	Siliconas Spray	Data caducitat de l'envàs*	
MUPIROCINA GALENICUM DERMA® 20mg/g	Mupirocina	10 dies	
FURACIN® 2mg/g	Nitrofur	Caducitat de l'envàs*	Protegit de la llum / Tª < 30°C
INTRASITE GEL ® (HIDROGELS)	Carboximetilcelulosa sódica	1 setmana (Ús individual)	
IODOSORB® 4g	Codexomer Iodat	3 mesos (Ús individual)	Temperatura ambient (15 °C a 25 °C)
IRUXOL MONO®	Clostridopeptidasa	6 mesos	
LUBRICANT TETRACAÏNA LAINCO® 7,5 mg/g	Hidrocloruro Tetracaïna	Caducitat de l'envàs*	
LINIMENTO OLEOCALCAREO + OZN 10%	Òxid de zinc	Caducitat de l'envàs*	

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT PER EL MANEIG I US DE MEDICAMENTS MULTIDOSI	
Edició: 1	Data: 01-08-2025	Pàgina 14 de 14

MEPENTOL ® / MEPENTOL LLET	Àcids Grasos Hiperoxigenats	12 mesos	
MICRODACYN ®	Clorur de sodi+ H2O electrolitzada	1 mes	
THROMBOCID ®	Pentosano polisulfat sodi	Caducitat de l'envàs*	
Data actualització: 01-09-2025		*Sempre que les condicions siguin les idònies. (Pàgina 1 de 2)	
NOM COMERCIAL	PRINCIPI ACTIU	VALIDESA ENVÀS OBERT	OBSERVACIÓ
Via tòpica: pegats cures nafres			
TOTS	No procedeix	Ús individual	Protegit de la llum / Tª < 25°C
Via tòpica: antisèptics i desinfectants			
AIGUA OXIGENADA 500ml	Peròxid d'hidrogen	Data caducitat de l'envàs*	Temperatura ambient (15 °C a 25 °C)
ALCOHOL 70º	Alcohol 70º	Data caducitat de l'envàs*	
CLORHEXIDINA SOL. AQUOSA	Clorhexidina	3 mesos	
CLORHEXIDINA SOL. ALCOH.	Clorhexidina	6 mesos	
CLOR SCRUB ®	Digluconat Clorhexidina	Data caducitat de l'envàs*	
IODINA ® 125 ml	Povidona	Data caducitat de l'envàs*	
MICRODACYN ®	Àcid Hipoclorós, hipoclorit Sòdic	8 setmanes*	
NOBECUTAN ®	Acetat d'Etil + Propelent	Data caducitat de l'envàs*	
POVIDONA IODADA	Povidona Iodada	Data caducitat de l'envàs*	
SABÓ QUIRÚRGIC ANTISEPTIC CURADONA SCRUB	Povidona Iodada	Data caducitat de l'envàs*	
STERILLIUM GEL 100ML	Alcohol 70º	Data caducitat de l'envàs*	
Via oftàlmica: Col·liris i pomades oftàlmiques			
TOTS EL COL·LIRIS	No procedeix	4 setmanes/Us individual	Temperatura ambient (15 °C a 25 °C)
Via inhalatòria i nasal: aerosols			
TOTS INHALADORS D'ENVÀS A PRESSIÓ	No procedeix	Data caducitat de l'envàs/Ús individual	Temperatura ambient (15 °C a 25 °C)
BUDESONIDA ® Nebulització	Budesonida	Obert el sobre que conté monodosis 3 mesos. Oberta monodosis us immediat.	Protegit de la llum / Tª < 25°C
IPRATROPIO BROMURO® Nebulització	Ipratropio Bromuro		
Perfusions-dilucions			
TOTES (Consultar Document perfusions)	No procedeix	24 hores	Temperatura inferior a 25 °C Segons fàrmac, protegir de la llum
Tires reactives			
COAGUCHECK ®	Determinació coagulació	Data caducitat de l'envàs*	A Tª ambient o al refrigerador 2-30 °C
CONTOUR ®	Determinació glucosa	Data caducitat de l'envàs*	Conservació a Tª 5-30 °C
DIRUI®	Anàlisi d'orina àcid acetoacètic	Data caducitat de l'envàs*	Conservació a Tª 15-30 °C
TIRA ORINA 11 PARAMETROS ACRO BIOTECH ®	Anàlisi d'orina	6 mesos	A Tª ambient o al refrigerador 2-30 °C
Insulines			
TOTES LES INSULINES	PLOMA	4 setmanes (28 dies)	Abans d'obrir: 2-8°C. Després d'obrir: < 25°C
Data actualització: 01-09-2025		*Sempre que les condicions siguin les idònies. (Pàgina 2 de 2)	