

MESURES DE PROTECCIÓ PER A PROFESSIONALS D'ATENCIÓ RESIDENCIAL (personal assistencial de la residència i dels equips sanitaris que els ofereixen suport)

El personal sanitari que atengui casos en investigació, probables o confirmats per infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 han de portar un equip de protecció individual per a la prevenció d'infeccions amb **masketa quirúrgica, guants i bata d'un sol ús**.

Si s'han de practicar maniobres amb risc d'esquitxada (higiene, aspiració de secrecions, qualsevol possible contacte amb fluids, neteja de superfícies) cal portar un equip de protecció individual per a la prevenció d'infecció per microorganismes transmesos per gotes i per contacte, que inclogui **bata impermeable de màniga llarga, guants i protecció ocular amb ulleres antiesquitxades (aquestes es poden reutilitzar si es desinfecten de forma adequada)**. Es recomana com a mesura de precaució la utilització de la **masketa FFP2**, que es reutilitzarà 7 dies. **Es col·locarà a sobre una masketa quirúrgica d'un sol ús**.

De manera general, no s'han de realitzar procediments que generin aerosols en l'assistència a la residència, ja que les maniobres que generin aerosols s'han de realitzar preferentment en habitacions amb pressió negativa.

Després de l'assistència al pacient, **l'equip de protecció individual que usi el personal sanitari s'haurà de retirar a l'interior de l'habitació (al cubell amb tapa especificat amb anterioritat)** a excepció de les ulleres i la masketa FFP2, que s'hauran de retirar fora d'aquesta.

Cada cop que es retiri, abans i després, un equip de protecció individual **s'haurà de fer la higiene de mans amb solució hidroalcohòlica**.

Les ulleres caldran rentar-les amb aigua i sabó i amb alcohol del 70°.

Els professionals assistencials del centre i els equips assistencials externs han de fer autovigilància de l'aparició de símptomes d'infecció respiratòria aguda com ara febre, tos, dolor de coll, dificultat per respirar i, en cas que apareguessin, comunicar-ho als serveis de salut laboral.

El professional haurà de tenir:

- Masketa quirúrgica
- Masketa FFP2: Quan s'ha de fer una tècnica amb el pacient es col·locarà la masketa FFP2 i a sobre la quirúrgica.
- Bata d'un sol ús
- Bata impermeable
- Ulleres o protecció ocular contra esquitxades
- Alcohol de mans
- Desinfectant de superfície o tovalloles desinfectants
- Peücs
- "Gorro"

La retirada de residus i el circuit de retirada el farà la mateixa residència.

MESURES DE PROTECCIÓ PER A PROFESSIONALS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (personal assistencial per a hospitalització domiciliària)

El personal sanitari que atengui casos en investigació, probables o confirmats per infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 han de portar un equip de protecció individual per a la prevenció d'infeccions amb **maskareta quirúrgica , guants i bata d'un sol ús**.

Si s'han de practicar maniobres amb risc d'esquitxada (higiene, aspiració de secrecions, qualsevol possible contacte amb fluids, neteja de superfícies) cal portar un equip de protecció individual per a la prevenció d'infecció per microorganismes transmesos per gotes i per contacte, que inclogui **bata impermeable de màniga llarga, guants i protecció ocular amb ulleres antiesquitxades (aquestes es poden reutilitzar si es desinfecten de forma adequada)**. Es recomana com a mesura de precaució la **utilització de la maskareta FFP2**, que es reutilitzarà 7 dies. **Es col·locarà a sobre una maskareta quirúrgica d'un sol ús**.

Després de l'assistència al pacient, l'equip de protecció individual que usi el personal sanitari s'haurà de retirar a l'interior de l'habitació (a la bossa de galga 220) a excepció de les ulleres i la maskareta FFP2, que s'hauran de retirar fora del domicili. Les ulleres caldrà desinfectar-les amb desinfectant de superfície o tovallolotes desinfectants.

Cada cop que es retiri, abans i després, un equip de protecció individual s'haurà de fer la higiene de mans amb solució hidroalcohòlica.

Els professionals assistencials del centre i els equips assistencials externs (EAP, EAR, etc.) han de fer autovigilància de l'aparició de símptomes d'infecció respiratòria aguda com ara febre, tos, dolor de coll, dificultat per respirar i, en cas que apareguessin, comunicar-ho als serveis de salut laboral.

El professional tindrà a banda del material que necessiti per a la seva pràctica:

- Maskareta quirúrgica
- Maskareta FFP2: Quan s'ha de fer una tècnica amb el pacient es col·locarà la maskareta FFP2 i a sobre la quirúrgica.
- Bata d'un sol ús
- Bata impermeable
- Ulleres o protecció ocular contra esquitxades
- Alcohol de mans
- Desinfectant de superfície o tovallolotes desinfectants
- Peücs
- "Gorro"
- 2 Bosses de residus biosanitàries

GUIA D'ACTUACIÓ

S'ha d'intentar que el domicili tingui un cubell o paperera ubicat a l'habitació on està el pacient i si és amb pedal millor.

Abans d'entrar a l'habitació

- El professional haurà de posar-se els EPI abans d'entrar en contacte amb el pacient, deixarà una bossa de residus fora de l'habitació i tindrà una altra per dins de l'habitació.

Dins l'habitació

- Farà la visita i/o tècnica amb els EPI corresponents.
- Després de l'assistència al pacient, es retirarà adequadament l'equip de protecció en la zona on està el pacient (habitació del pacient) i es llençarà tot a la bossa de l'interior de l'habitació, excepte les ulleres i mascareta FFP2.

Fora de l'habitació

- Es col·locarà la bossa de l'interior dintre de la bossa exterior.
- S'emportarà les bosses per llençar a zona verda del Centre Sociosanitari El Carme.
- El professional es retirarà la mascareta FFP2 i la guardarà dintre d'un sobre de paper.
- També es retirarà les ulleres o protector ocular. Netejarà les ulleres amb aigua i sabó, si es pot, o amb el netejador de superfícies per poder continuar amb la resta d'activitat.
- De tornada al centre, caldrà rentar les ulleres amb aigua i sabó i amb alcohol del 70°.

Cada cop que es retiri abans i després un equip de protecció individual s'haurà de fer la higiene de mans amb solució hidroalcohòlica pertinent.