


Recomanacions per a professionals sanitaris de prevenció de la infecció per Coronavirus SARS-Cov-2

En la situació epidemiològica actual de transmissió comunitària generalitzada, cal un ús responsable del material de protecció que es finit i necessari durant tot l'estat d'alarma.

- Extremar al màxim les mesures d'higiene de mans amb aigua i sabó o solució alcohòlica. Aquesta mesura està en les nostres mans.
- Els pacients amb clínica respiratòria i/o febre sense gravetat no han de venir als centres. El Pla de Contingència de BSA ja indica les alternatives per a aquests pacients.
- Si es necessària la visita urgent de pacients que presentin clínica respiratòria i/o febre, utilitzar mascareta quirúrgica i guants. Els professionals dels Serveis d'Urgències, hospitalització HMB i CSSC i professionals que treballin amb pacients amb risc d'immunosupressió han de portar la mascareta quirúrgica i guants durant tota la jornada perquè són els que tenen contacte amb possibles pacients de coronavirus.



Pàgina 9
Guia d'actuació
enfrent de casos
d'infecció pel nou
coronavirus
SARS-CoV-2
18/03/2020



- El personal sanitari que atengui casos en **investigació, probables o confirmats** o les persones que entrin en l'habitació d'aïllament han de portar un equip de protecció individual: mascareta quirúrgica, bates d'un sol ús i guants.
- En cas de realitzar tasques que impliquin risc **d'esquitxades** (higiene, aspiració de secrecions, qualsevol possible contacte amb fluids, neteja de superfícies) cal portar l'EPI per a la prevenció d'infeccions per microorganismes transmesos per gotes i per contacte, que inclogui una mascareta quirúrgica, bata impermeable de màniga llarga, guants i protecció ocular amb ulleres antiesquitxades (aquestes es poden reutilitzar si es desinfecten de forma adequada).
- En els procediments que generen **aerosols** (qualsevol procediment sobre la via aèria, com ara la intubació traqueal, el rentat broncoalveolar o la ventilació manual), s'han de reduir al mínim el nombre de persones presents en l'habitació i tots han de portar: Una mascareta d'alta eficàcia FFP-2 o FFP3, ulleres de protecció o protector facial complet, guants, bata impermeable de màniga llarga (si la bata no és impermeable i es preveu que es produeixin esquitxades de sang o altres fluids corporals, cal afegir un davantal de plàstic).
- S'ha de mantenir una estricta higiene de mans abans i després de l'atenció al pacient i de la retirada de l'equip de protecció individual.

Prevenció

Mancomunitat Sanitària de Prevenció

SEQÜÈNCIA PER POSAR-SE ELS EPIs



1. RENTAT DE MANS

2. POSAR BATA



3. POSAR MASCARETA
FFP2/FFP3



4. POSAR ULLERES



5. POSAR GUANTS

SEQÜÈNCIA PER TREURE'S ELS EPIs



1. RETIRAR GUANTS

+
RENTAT DE MANS



2. RETIRAR LA BATA

+
RENTAT DE MANS



3. RETIRAR LES ULLERES

+
RENTAT DE MANS



4. RETIRAR
MASCARETA
FFP2/FFP3 FORA DE
L'HABITACIÓ O BOX



5. RENTAT DE MANS